

PLAGAS DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS

Nombre Común	Nombre Científico	Tamaño Adulto	Color del Adulto	Ciclo de Vida	Estadio Destructivo	Mercancía Atacada	Características
Gorgojo de los graneros	Sitophilus granarius (L)	2—5 mm	Café rojizo a café obscuro	40—120 días	Larvas y adultos	Trigo, arroz, maíz jowar	Cosmopolita. Daños secundarios por moho por humedad excesiva
Gorgojo del arroz	S. orizae (L)						
Gorgojo del maíz	S. zeamais (M)						
Barrenador menor de los granos	Rhizopertha dominica (F)	2—3 mm	Negro	30 días	Larvas y adultos	Granos, harinas	Cosmopolita. Gorgojos de fuertes mandíbulas vacían el grano
Palomilla Angoumois	Sitotroga cerealella (O)	Longitud 6—9 mm Alas 13—19 mm	Buff	60 días	Larvas	Granos almacenados, granos muy húmedos en campo	Distribuido en todo el mundo. Activo en clima frío
Palomilla de la India	Plodia interpunctella (H)	Longitud 10 mm Alas 14—20 mm	Blanco grisáceo y café rojizo	30—300 días	Larvas	Granos y gran variedad de productos comestibles	Distribución mundial. Confinado a profundidad de 20 cm formando red de seda junto con los sacos de las pupas
Palomilla Mediterránea de la harina	Ehpestia kuehniella (Z)	Longitud 10—14 mm Alas 20—22 mm	Gris claro a blancuzco	45-70 días	Larvas	Harina, nueces, frutas secas, molinos de harina y productos comestibles en el almacén	Las redes sedosas tejidas por las larvas interfieren con la operación del molino
Gorgojo confuso de la harina	Tribolium confusum (J.duV.)	3—5 mm	Café rojizo	60—85 días	Larvas y adultos	Todos los cereales y maltas	Distribución mundial. Sobrevive bajas temperaturas
Gorgojo rojo de la harina	Tribolium castaneum (H)	3—5 mm	Café rojizo	90—150 días	Larvas y adultos	Cereales, frutas secas, especias	Cosmopolita
Gorgojo serrado de los granos	Oryzaephilus surinamensis (L)	2.5—3.5 mm	Café obscuro	30—70 días	Larvas y adultos	Cereales y derivados, tabaco, caña, nueces	Mundial. Su forma plana favorece infestación de productos en pacas
Gorgojo Cadella del pan	Tenebroides mauritanicus (L)	11 mm	Negro brillante	4—10 meses	Larvas y adultos	Molinos, silos, almacenes granos y derivados	Cosmopolita. Prefiere lugares oscuros
Gorgojo plano de los granos graneros	Cryptolestes pusillus (S)	2 mm	Café rojizo	35—65 días	Larvas y adultos	Harina y granos	Gorgojos minúsculos. Infestación asociada con el gorgojo de los
Gorgojo de Khapra	Trogoderma granarium (E)	2—3 mm	Café rojizo a café muy obscuro	30—45 días	Larvas y adultos	Almacenes, silos, molinos, malta y granos	Cosmopolita
Gorgojo de los almacenes	Stegobium panicetum (L)	2—3 mm	Café rojizo	70—200 días	Larvas y adultos	Granos y derivados	Cosmopolita y omnívoro
Gorgojo de los cueros	Dermestes lardarius (L) Dermestes maculatus (D.G)	7—9 mm	Negro	70—200 días	Larvas y adultos	Cuero y procesadoras de alimentos	Distribución mundial
Gorgojo copra	Necrobia rufipes (D)	5 mm	Azul verdoso brillante	40—100 días	adultos	Carne seca	Cosmopolita; predadores de otras larvas
Gorgojo del café	Aracrus fasciculatus (D)	1.5—4 mm	Café obscuro con manchas café claro	60—100 días	Larvas y adultos	Café y cacao en grano; maíz, frutas secas, especias	Distribución mundial
Gorgojo de los cigarrillos	Lasioderma serricornis (P)	2—4 mm	Café rojizo claro	50 días	Larvas y adultos	Tabaco almacenado	Cosmopolita. También infesta cereales
Palomilla de los almacenes	Euphestia cautella (W)	Longitud 13 mm Alas 10—20 mm	Gris claro	45—70 días	Larvas	Cereales	Cosmopolita
Palomilla del tabaco	Euphestia elutella (H)						
Gorgojo araña de Australia	Ptinus tectus (B)	2—2.5 mm	Café obscuro rojizo	4—6 meses	Larvas y adultos	Alfombras y pieles	Cosmopolita. Prefiere temperaturas bajas
Gorgojo negro de los tapetes	Attagenus pello (L)	5 mm	Negro mate	Más de 1 año	Larvas y adultos	Pieles, cueros, muebles, textiles	Distribución mundial
Roedores							
Rata Bandicoot	Bandicota bangalensis	Longitud 36—48 cm	Pelo café obscuro corto y grueso				Ataca cultivos en campo y alimentos almacenados
	B. indica	Longitud 51—68 cm	Pelo negro muy grueso, con espinas				
Ratón de campo	Mus booduga	Longitud 9—16 cm	Café				Ataca cultivos en campo
Rata gerbil	Tatera indica	Longitud	Café				Ataca cultivos en campo